

전라북도 감염병 주간소식지



[제20-33호] 2020년 44주차 (10.25.~10.31.)

• 발행일: 2020. 11. 6. • 발행처: 전라북도 감염병관리지원단 • 주소: 전라북도 전주시 완산구 효자로 225 18층 • 발행인: 이주형
• 전화: 063-280-3778 • 홈페이지: <http://jcid.or.kr>

「 사회적 거리두기 방역수칙을 지켜주세요! 」

개인 위생수칙 준수하며 불필요한 외출 자제하기, 발열·호흡기 증상 시 적절한 휴식 취하기

코로나19 국내 신고 및 검사 현황 (단위: 명)

* 자료원: 11.6. 중앙방역대책본부 국내 발생 현황(0시 기준), 전라북도 일일상황보고(8시 기준)


구분	의사환자 총계	결과 양성				결과 음성
		확진자	격리해제	격리 중	사망	
전국	-	27,195	24,821	1,898	476	-
전북	57,153	167	155	11	1	56,986

코로나19 지역별 확진자 현황 (단위: 명, 1.3일 이후 누계) * 자료원: 11.6. 중앙방역대책본부 국내 발생 현황(0시 기준), 전라북도 일일상황보고(8시 기준)

구분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	검역
격리중	1,898	530	37	38	50	9	16	7	3	625	48	14	106	11	14	14	37	1	338
격리해제	24,821	5,627	548	6,949	1,000	504	421	156	79	4,908	241	178	512	155	174	1,520	301	59	1,489
사망	476	78	13	196	11	3	6	2	0	93	3	3	8	1	2	57	0	0	0
합계	27,195	6,235	598	7,183	1,061	516	443	165	82	5,626	292	195	626	167	190	1,591	338	60	1,827

코로나19 전국 일별, 누적 확진자 발생 추이 (11.6. 0시 기준, 5.1일 이후)

* 자료원: 중앙방역대책본부 국내 발생 현황




코로나19 관련 최근 국내 주요 정책

- 전국 사회적 거리두기 1단계 조치(10.12~)
- 사회적 거리두기 체계 개편 시행(11.7~)
- 중점관리시설 9종* 전자출입명부 사용 의무화(11.7~)
*클럽 등 유흥주점, 단란주점, 감성주점, 헌팅포차, 콜라텍, 노래연습장, 방문판매 등 직접판매홍보관, 실내스탠딩공연장, 식당·카페(150㎡ 이상)
- 전라북도 전 지역 마스크 실내 착용 의무화 행정조치(8.19~), 위반 시 과태료 부과(11.13~)

연번	확진일	지역	연관성	최초증상
129	10.2	익산	해외 방문(이집트 입국)	증상없음
130	10.4	전주	해외 방문(폴란드 입국)	증상없음
131	10.4	전주	확진자의 접촉자	20.10.3. 발열
132	10.4	전주	확진자의 접촉자	20.10.4. 발열, 기침
133	10.5	정읍	정읍 00마을	20.10.3. 두통
134	10.5	정읍	정읍 00마을	증상없음
135	10.5	정읍	정읍 00마을	증상없음
136	10.5	정읍	정읍 00마을	증상없음
137	10.5	정읍	정읍 00마을	증상없음
138	10.5	정읍	정읍 00마을	증상없음
139	10.5	정읍	정읍 00마을	증상없음
140	10.5	정읍	정읍 00마을	증상없음
141	10.5	정읍	정읍 00마을	증상없음
142	10.6	전주	해외 방문(중국 입국)	증상없음
143	10.6	정읍	정읍 00마을	증상없음
144	10.6	완주	해외 방문(카자흐스탄 입국)	증상없음
145	10.6	전주	확진자의 접촉자	증상없음
146	10.6	임실	확진자의 접촉자	20.10.5. 발열, 기침
147	10.6	정읍	정읍 00마을	증상없음
148	10.6	정읍	정읍 00마을	증상없음
149	10.6	정읍	정읍 00마을	20.10.5. 두통
150	10.11	전주	타지역 방문	20.10.5. 발열
151	10.11	군산	해외 방문(미국 입국)	경미한 호흡곤란
152	10.12	전주	확진자의 접촉자	20.10.11. 기침, 가래
153	10.13	전주	해외 방문(이집트 입국)	증상없음
154	10.15	전주	확진자의 접촉자	20.10.13. 열감, 소화불량
155	10.15	전주	조사중	20.10.11. 근육통
156	10.18	군산	해외 방문(스위스 입국)	증상없음
157	10.21	정읍	확진자의 접촉자	20.10.18. 기침
158	10.21	정읍	확진자의 접촉자	20.10.20. 인후통, 근육통
159	10.22	고창	확진자의 접촉자	증상없음
160	10.22	고창	확진자의 접촉자	20.10.21. 발열
161	10.27	정읍	확진자의 접촉자	증상없음
162	10.28	전주	확진자의 접촉자	증상없음
163	10.28	전주	확진자의 접촉자	20.10.26. 두통
164	10.28	전주	확진자의 접촉자	20.10.27. 두통
165	10.29	전주	해외 방문(인도 입국)	증상없음
166	10.29	익산	확진자의 접촉자	20.10.29. 발열
167	11.5	군산	해외 방문(미국 입국)	2020.11.5. 기침

■ 확진자 일별 발생 및 감염재생산지수 현황




• 코로나19 전라북도 감염재생산지수* : 0.3 (95% 신뢰구간: 0.0-1.3)

최근 1주(10.31~11.6) 평균 감염재생산지수 : 0.6 기준일시 11.6. 14시

* 감염재생산지수 : 감염성이 있는 환자가 감염 가능 기간동안 직접 감염시키는 평균 인원수

• 해외유입을 제외한 지역사회 발생 현황으로 확진일을 기준으로 작성되었으며, 거리두기 등 요인에 의해 변경 가능함

■ 확진환자 역학적 특성



• 성별 : 전체 환자 128명 중 남자 74명(58%), 여자 54명(42%)이었음

• 연령별 : 전체 환자 128명 중 50대(22.7%), 30대(21.9%), 60대(14.8%) 순으로 많이 발생함

구분	누적 확진자 수(명)	누적 사망자 수(명)	치명률(%)	인구10만명당 발생자 수(명)*	
1	미국	9,281,928	231,034	2.5	2,820.4
2	인도	8,364,086	124,315	1.5	611.1
3	브라질	5,566,049	160,496	2.9	2,620.6
4	러시아	1,712,858	29,509	1.7	1,190.3
5	프랑스	1,509,315	38,355	2.5	2,304.3
6	스페인	1,284,408	38,118	3.0	2,768.1
7	아르헨티나	1,196,412	32,052	2.7	2,652.8
8	영국	1,099,063	47,742	4.3	1,640.4
9	멕시코	938,405	92,593	9.9	709.3
10	페루	908,902	34,623	3.8	2,762.6
11	남아프리카	730,548	19,585	2.7	1,257.4
주요 국내 입국 국가	이라크	485,870	11,128	2.3	1,202.6
	인도네시아	421,731	14,259	3.4	156.5
	방글라데시	414,164	6,004	1.4	246.4
	필리핀	388,137	7,367	1.9	359.1
	파키스탄	337,573	6,867	2.0	165.0
	카자흐스탄	152,725	2,259	1.5	821.1
	일본	103,838	1,794	1.7	81.8
	중국	92,077	4,747	5.2	6.5
	우즈베키스탄	67,932	579	0.9	207.1
	키르기즈스탄	61,309	1,167	1.9	988.9
	싱가포르	58,036	28	0.0	983.7
	말레이시아	35,425	271	0.8	109.0
	태국	3,810	59	1.5	5.5
	대한민국	27,050	475	1.8	52.2

주요 발생 감염병 현황

<div> 쯔쯔가무시증 중증열성혈소판감소증후군 </div>	<ul style="list-style-type: none"> 전북 44주 신고 51건 (43주 19건, 42주 7건) 전국 44주 신고 403건 (43주 242건, 42주 79건) 	<ul style="list-style-type: none"> 감염된 털진드기 유충이 사람을 물어 감염 진드기 유충에 물린 부위에 나타나는 가피 형성이 특징적임. 피부가 겹치고 습한 곳으로 가슴·겨드랑이·복부·종아리 등에서 많이 확인됨. 그 외 심한 두통, 발열, 오한이 갑자기 발생하며 감기와 유사 야외활동 후 감기와 비슷한 증상이나 가피(검은 딱지)가 발견되면 즉시 의료기관을 방문하여 진료 가을철 많은 발생을 보이므로 진드기매개감염병 예방수칙 준수
	<ul style="list-style-type: none"> 전북 44주 누적 확진환자 11건 전국 44주 확진환자 1건 (43주 7건, 42주 21건) 	<ul style="list-style-type: none"> 4월부터 환자발생 증가하며 50대 이상 연령에서 발생비율 높음 감염된 작은소피참진드기 등이 사람을 물어 감염 야외활동 후 2주 이내에 고열(38-40℃), 소화기증상(오심, 구토, 설사 등)이 있을 경우 즉시 의료기관을 방문하여 진료 등산, 나물채취 등 야외활동 시 진드기에 물리지 않도록 주의하고, 진드기매개감염병 예방수칙 준수 - 작업복/일상복 구분, 기피제 사용, 돗자리 사용, 옷을 털고 세탁하기, 외출 후 목욕하고 옷 갈아입기 등

전라북도 감염병 전수감시 발생신고 현황 [44주차 : 2020.10.25. ~ 2020.10.31.]

구분	전북						전국				
	2020년			최근 5년 5주 평균†	5주 평균 대비	동기간(44주)누적			동기간(44주)누적		
	44주	43주	42주			2020	2019	2018	2020	2019	2018
1급 보툴리눔독소증	0	0	0	0.00	-	0	1	0	1	1	0
신종감염병증후군	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	0
중동호흡기증후군(MERS)	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	1
2급 수두	11	20	12	66.16	▼	1,116	2,345	3,097	28,409	65,099	72,459
홍역	0	0	0	0.00	-	0	5	0	7	194	11
콜레라	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	1	2
장티푸스	0	0	0	0.08	▼	1	3	3	69	96	191
파라티푸스	0	1	0	0.04	▼	1	2	2	103	54	41
세균성이질	0	0	0	0.00	-	0	1	1	39	116	176
장출혈성대장균감염증	0	0	0	0.04	▼	2	4	2	311	151	110
A형간염	4	6	2	4.00	-	176	524	138	3,126	16,997	2,083
백일해	0	0	0	0.20	▼	2	13	13	123	390	831
유행성이하선염	12	11	6	18.04	▼	393	656	722	8,875	14,059	16,620
풍진(선천성)	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	0	0
풍진(후천성)	0	0	0	0.00	-	0	0	0	2	8	0
수막구균 감염증	0	0	0	0.00	-	0	0	0	6	14	13
b형헤모필루스인플루엔자	0	0	0	0.00	-	0	0	0	1	0	2
폐렴구균 감염증	0	0	0	0.36	▼	8	19	9	304	424	536
한센병	0	0	0	0.00	-	0	0	0	3	3	4
성홍열	0	0	0	8.44	▼	57	218	713	2,241	6,529	14,244
반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증	0	0	0	0.00	-	0	2	0	9	2	0
카바페넴내성장내세균속군종(CRE) 감염증	19	25	26	10.87	▲	631	325	382	14,039	12,914	10,100
E형간염	0	0	1	-	-	9	-	-	121	-	-
3급 파상풍	0	0	0	0.00	-	3	1	3	25	28	27
B형간염	0	0	2	0.44	▼	14	14	11	296	324	332
일본뇌염	0	0	0	0.00	-	0	0	0	4	32	17
C형간염	3	4	10	3.76	▼	273	288	300	9,767	8,283	9,142
말라리아	0	0	0	0.00	-	4	2	5	382	546	563
레지오넬라증	0	0	1	0.00	-	11	6	2	315	387	252
비브리오패혈증	0	0	0	0.04	▼	2	2	1	69	35	47
발진열	0	0	0	0.12	▼	0	1	0	22	12	9
프프가무시증	51	19	7	120.76	▼	163	169	417	1,302	1,475	3,770
렙토스피라증	0	0	0	0.32	▼	7	6	2	108	104	87
브루셀라증	0	0	0	0.00	-	3	0	0	6	1	5
신증후군출혈열	1	1	3	2.68	▼	31	43	40	171	280	325
크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD)	0	0	0	0.08	▼	3	2	1	64	51	46
댕기열	0	0	0	0.24	▼	0	7	2	43	240	128
큐열	0	0	0	0.08	▼	6	19	7	66	200	143
라임병	0	0	0	0.00	-	0	0	1	7	21	19
유비저	0	0	0	0.00	-	0	0	0	1	6	1
치쿤구니아열	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	15	3
중증열성혈소판감소증후군(SFTS)	1	0	1	0.32	▲	11	18	13	232	223	258
지카바이러스감염증	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0	8	2

- 본 통계는 질병관리본부 감염병포털에서 제공되는 전수감시 자료로 변동가능한 잠점통계임.
 - 각 질병별로 규정된 신고범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함한 자료임.
 - 최근 5년간(2015-2019년) 국내에 발생하지 않은 감염병은 제외됨.
 - 일부 감염병은 법령개정으로 추가된 이후부터 합산된 평균 통계임.
- MERS(2015), 지카바이러스감염증(2016), C형간염 및 의료관련감염병 2종(반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증·카바페넴내성장내세균속군종(CRE)감염증)(2017), E형간염(2020)
 - 제2급 감염병 E형간염은 2020.6.4. 법령개정으로 추가됨.
- § 신종감염병증후군으로 관리되고 있는 코로나바이러스감염증-19는 감염병포털 상 집계되지 않음
- † 최근 5년(2015-2019년)의 해당 주차를 중앙으로 계산한 5주간의 평균임.



가을 여유는 가족과 집 근처에서 즐기세요!

모임 등 단체 활동을 자제하고, 가족단위로 활동하세요

✓ 계획할 때

- 발열 및 호흡기증상 등이 있다면 여행은 취소하기
- 한적한 야외장소로 일정은 짧게 여행하기

✓ 이동할 때

개인차량이나 대중교통 이용하기

- ① (역사·터미널) ▲온라인예매, 모바일 체크인 등 활용 ▲음식섭취는 지정된 장소 이용
- ② (차량 내부) ▲거리유지 ▲마스크 착용 ▲손위생 준수 ▲노래·음주·대화 및 음식 섭취 자제, 자주 환기
* 불가피한 통화는 마스크 착용한 상태로 작은 목소리로
- ③ (휴게소) 가급적 방문 자제, 방문 시 ▲마스크 착용하고 짧게 머무르기, 음식은 지정된 장소에서 섭취하기

✓ 산행 및 야외활동을 할 때

- 다른 사람과 2m 이상 거리를 유지하고, 거리 두기가 어려울 경우 마스크* 상시 착용하기
* 숨이 차서 호흡이 어려운 경우, 거리두기 가능한 공간에서 마스크 벗고 휴식
- 함성, 노래 등 침방울이 될 수 있는 행위 자제하기
- 산행·야외활동 후 밀폐·밀집·밀접 장소(유흥시설, 노래방 등) 방문 자제하기

✓ 식사를 할 때

- 대규모 식당 등을 이용한 단체 식사 자제하기
- 혼잡하지 않은 장소와 시간 활용 및 이동 시 · 식사 후 마스크 상시 착용하기
- 음식 섭취 시 거리 유지, 손 위생, 대화 자제, 개인접시에 덜어먹기(나눔 자제)

✓ 귀가 후

- 발열 및 호흡기증상 관찰하고 외출·모임 자제하기
* 귀가 후 38도 이상 고열 지속, 증상 악화 시 콜센터(1399, 지역번호+120)나 보건소 문의 안내

※ 불가피한 단체모임에서는 방역관리자를 지정(모임의 인솔자, 가이드, 버스기사 등)하여 아래 수칙 준수

방역관리자가 할 일

- 명단 확보
- 방역수칙 사전 숙지 및 준수 관리
- 한적한 야외장소로 일정은 짧게 계획(반일, 당일 등)
- 발열 및 호흡기증상 사전확인 및 유증상 시 집에서 쉬도록 안내
- 침방울이 될 수 있는 함성, 노래, 큰소리로 대화 등 자제 유도
- 차량에서 음식 제공 및 섭취 자제 지도·관리
- 모임원이 코로나19 확진 시 다른 모임원에게 안내